

Broszura informacyjna dla pacjentów po usunięciu zęba i leczeniu chirurgicznym:

- **kompres uciskający ranę należy wypluć nie później niż 10 min po zabiegu, nie należy przetrzymywać go zbyt długo żeby nie związał się ze skrzepem**
- **w okolicy po zabiegowej należy wykonywać okłady z lodu (15 min. i 15 min. przerwy) przez kilka godzin po zabiegu (zewnątrznie przez ściereczkę)**
- **pić i jeść można od razu po zabiegu, wskazane są pokarmy półpłynne i zimne np. shake, lody**
- po zabiegu wskazane jest przyjęcie leku przeciwbólowego, lepiej przyjmować leki przeciwbólowe przed wystąpieniem bólu
- jeżeli zapisany został antybiotyk, również należy przyjąć pierwszą dawkę jak najszybciej i przyjmować zgodnie z zaleceniami w równych odstępach czasu
- należy stosować dietę papkowatą lub półpłynną przez kilka dni po zabiegu
- **od dnia następnego należy delikatnie przepłukiwać (przelewać) jamę ustną szalwią, rumiankiem lub roztworem Eludrilu, Dentoseptu lub Azulanu, należy oczyszczać miękką szczoteczką "pozabiegową" zęby i szwy w okolicy pozabiegowej**
- nie należy wykonywać wysiłku do 24 godz. po zabiegu, czasami dłużej jeżeli operowana była okolica kontaktująca z zatoką szczękową
- nie należy intensywnie płukać ust (aby nie wypłukać skrzepu)
- dolegliwości mogą wystąpić do 2-3 dni po zabiegu, dolegliwości powinny ustępować
- nieznaczne dolegliwości bądź dyskomfort mogą wystąpić nawet do miesiąca, nawet po okresie bez bólu
- tydzień po zabiegu powinno być widoczne wyraźne gojenie rany
- **brak gojenia rany, bądź nieustępująca bolesność są wskazaniem do zgłoszenia się do Poradni**
- **jeżeli zalecona została kontrola (przeważnie po 7 dniach) należy się na nią zgłosić**
- podkrwawianie może występować po zabiegu

- w razie intensywnego krwawienia należy wykonać mocny ucisk jałowym kompresem na 15-20 min., w razie braku efektu, w przypadku wypluwania dużych skrzepin (gdy krew krzepnie w jamie ustnej a nie w zębodole) należy niezwłocznie skontaktować się z naszą rejestracją lub zgłosić się na pogotowie
- gojenie może być utrudnione w przypadku zębów zakażonych , z ropniem, zębów zatrzymanych czy zarośniętych korzeni
- w czasie usuwania dochodzi do uszkodzenia kości, odłamki kostne mogą wychodzić z zębodołu w czasie gojenia się, mają one postać ostrych elementów wyczuwalnych językiem, z reguły wychodzą one same, **nie należy mylić ich z pozostawieniem fragmentu zęba**

Profesjonalnie rozwiążemy Twój chirurgiczny problem!
Przeczytaj czym zajmuje się chirurg stomatolog i w czym chętnie Ci pomożemy:

- Implantologia stomatologiczna, podniesienie dna zatok szczękowych, augmentacja [odbudowa] kości
- Usunięcie zębów z zaopatrzeniem przed implantologicznym - zabiegi mające na celu zachowanie kości w miejscu gdzie planowany jest implant
- Usunięcie zębów
- Leczenie niedokończonych zabiegów i powikłań po usunięciu zębów
- Operacyjne usunięcie zębów, w tym złamanych i zarośniętych korzeni oraz zębów mądrości - ósemek
- Operacyjne usunięcie torbieli szczęki i żuchwy
- Operacyjne zamknięcie połączenia ustno-zatokowego
- Usunięcie zmian i guzów błony śluzowej
- Usunięcie wielu zębów z szyciem rany i natychmiastowym zaopatrzeniem protezami
- Korekty kształtu dziąsła – gingivoplastyka
- Odślonięcie zębów zatrzymanych, usuwanie zębów dodatkowych - chirurgia przed ortodontyczna
- Przygotowanie do leczenia protetycznego – chirurgia przed protetyczna

- Korekty wędzidełek warg i języka - możliwość przeprowadzenia zabiegu laserem - chirurgia laserowa **więcej...** zajmujemy się również podcinaniem wędzidełek u noworodków i niemowląt z zaburzeniami ssania - informacje poniżej
- Sanację jamy ustnej (usunięcie zębów nienadających się do leczenia lub korzeni, które mogą stać się źródłem zakażenia w obrębie narządów wewnętrznych)
- Resekcje wierzchołków korzeni zębów
- Pobieranie wycinków do badania histopatologicznego
- Konsultacje i badanie w kierunku wyeliminowania ognisk zakażenia (np. przed leczeniem szpitalnym, kardiologicznym, okulistycznym, alergologicznym, reumatologicznym itp.)
- Pourazowe szynowanie zębów rozchwianych
- Szyny ochronne na zęby dla sportowców
- Zaopatrzenie zębów wybitych